

Dr. Murat Toktamışoğlu


KAL ESTETİK KLİNİKLERİ

À QUOI S'ATTENDRE

Guide des fillers dermiques

Guide patient de 20 pages pour la préparation,
le jour de l'acte et la récupération

20 pages | Français



Dr. Murat Toktamışoğlu

Médecine esthétique | drmurattoktamisoglu.com

NOTE D'INFORMATION MÉDICALE

filler dermique: attentes structurées et sécurité

filler dermique est discuté pour perte de volume, contour, proportion et plis sélectionnés. Ce guide décrit méthode, indication, déroulé et signes d'alerte sans promettre de résultat.

Note d'information médicale

Ce PDF est un guide général d'information patient. Il ne remplace pas un diagnostic, un plan de traitement, un conseil médicamenteux ou une orientation urgente personnalisés. L'indication dépend de l'examen, de l'analyse cutanée, des antécédents, des médicaments, des allergies, de la grossesse ou de l'allaitement et des attentes.

Comment utiliser ce guide

- Notez les questions à discuter avant le rendez-vous.
- Listez médicaments, compléments, allergies et actes antérieurs.
- Lisez les sections avant, pendant et après comme des points de contrôle.
- En cas de symptôme inattendu, contactez la clinique ou les urgences.

En bref

Ces pages transforment filler dermique en échange de sécurité: vérifier avant, comprendre pendant et surveiller après.

Avant

Anatomie, risque vasculaire, fillers antérieurs et tendance à l'oedème sont évalués.

Pendant l'acte


De petites quantités sont placées prudemment avec surveillance de la couleur, douleur et circulation.

Après

Oedème et bleus peuvent survenir; douleur intense, pâleur, couleur en réseau ou troubles visuels sont urgents.

Idée centrale

Le filler est une décision anatomique et de sécurité, pas seulement une question de volume.



Discussion d'indication

Cette page aide à vérifier si le moment, l'objectif et le cadre de sécurité sont adaptés.

Discussion d'indication

- Formuler des objectifs réalistes pour perte de volume, contour, proportion et plis sélectionnés.
- Comprendre la méthode et ses limites: injection lente d'un filler approprié.
- Clarifier risques, récupération et suivi photo.
- Soutenir une planification conservatrice.
- Préparer les questions pour l'évaluation médicale.

Reporter ou vérifier d'abord

- Infection active, infection dentaire, herpès ou inflammation cutanée.
- Filler antérieur incertain ou injection récente dans la même zone.
- Forte tendance à gonfler ou voyage sans contrôle possible.
- Risque vasculaire, auto-immun ou hémorragique à évaluer.
- Attente d'un grand changement plutôt qu'une correction mesurée.

Avant: préparation

Les consignes personnelles sont confirmées pendant l'évaluation. Ce cadre aide à préparer le rendez-vous.

2 semaines avant

- Pas d'infection, plaie ou coup de soleil.
- Médicaments et compléments listés.
- Allergies et actes antérieurs notés.

1 semaine avant

- Grossesse ou allaitement signalé.
- Nom du produit ou appareil à demander.
- Calendrier laissant du temps de récupération.

24 heures avant

- Reporter chaleur et sport intense.
- Timing maquillage et soins clair.
- Garder le rendez-vous de contrôle.

Checklist imprimable

Conçue pour être imprimée et apportée au rendez-vous. Les consignes médicaments et soins doivent être personnalisées.

- Pas d'infection, plaie ou coup de soleil.
- Médicaments et compléments listés.
- Allergies et actes antérieurs notés.
- Grossesse ou allaitement signalé.
- Nom du produit ou appareil à demander.
- Calendrier laissant du temps de récupération.
- Plan photo et contrôle à demander.
- Contact urgent enregistré.
- Consignes personnelles à écrire.

Mes notes

Déroulé du jour de l'acte

Zone nettoyée.

Zones cibles confirmées.

Matériel stérile à usage unique visible.


Douleur, brûlure ou trouble visuel signalés.

Détails produit ou appareil documentés.

Des pauses de confort peuvent être demandées.

Rythme du rendez-vous

Couleur, douleur et gonflement surveillés.



Que peut-on ressentir?

Savoir quoi signaler immédiatement est aussi important que connaître les sensations fréquentes.

Pendant l'acte

- Douleur, brûlure ou trouble visuel signalés.
- Des pauses de confort peuvent être demandées.
- Couleur, douleur et gonflement surveillés.
- Signalez douleur vive, croissante ou focalisée, brûlure, trouble visuel, vertige, gêne respiratoire ou difficulté à avaler.
- Consignes à domicile revues.

Signalez immédiatement

Signalez douleur vive, croissante ou focalisée, brûlure, trouble visuel, vertige, gêne respiratoire ou difficulté à avaler.

Après: premières 24 heures

Le premier jour vise à garder la zone calme et à repérer tôt les signes inhabituels.

01

Ne pas froter la zone.

02

Reporter chaleur et sport intense.

03

Timing maquillage et soins clair.

04

Suivre gonflement et rougeur par photos.

05

Ne pas gratter croûtes ou points.

06

Un petit bleu peut être temporaire.

Fenêtre de récupération et résultat

0-24 h

Rougeur, sensibilité, léger oedème ou marques ponctuelles peuvent apparaître.

2-3 jours

Les réactions légères doivent diminuer; surveillez les signes d'infection.

1 semaine

Les actifs reprennent progressivement seulement après accord.

4-8 semaines

Le suivi photo peut être utile selon l'acte.

2-3 mois

Les réponses tissulaires lentes s'évaluent plus justement.

Attendu ou à revoir?

Attendu

- Oedème
- Bleu
- Sensibilité à la pression
- Asymétrie précoce
- Fermeté temporaire

Avis rapide

- Douleur forte ou croissante
- Peau pâle, grise ou réticulée
- Modification visuelle
- Cloques ou peau ouverte
- Fièvre, pus ou rougeur croissante

Statut

En cas de doute, prenez une photo, notez l'heure et contactez la clinique.

Questions de sécurité

La sécurité dépend de la sélection du patient, de la documentation, de la préparation stérile, du suivi et du plan de complication.

- Pas d'infection, plaie ou coup de soleil.
- Médicaments et compléments listés.
- Allergies et actes antérieurs notés.
- Grossesse ou allaitement signalé.
- Matériel stérile à usage unique visible.
- Douleur, brûlure ou trouble visuel signalés.
- Détails produit ou appareil documentés.
- Un plan pour complication vasculaire et hyaluronidase existe-t-il si nécessaire?
- Y a-t-il aujourd'hui un signe ou un risque qui doit faire reporter l'acte?
- Produit/appareil, lot/série, dose/énergie et cartographie de traitement seront-ils documentés?
- Quel symptôme impose un contact le jour même, et lequel une prise en charge urgente?

Routine quotidienne et mode de vie

Routine cutanée

- Ne pas frotter la zone.
- Reporter chaleur et sport intense.
- Timing maquillage et soins clair.
- Suivre gonflement et rougeur par photos.

Rythme de vie

- Protection solaire, barrière cutanée et suivi régulier influencent la qualité du plan.
- Garder le rendez-vous de contrôle.

Rappel

Protection solaire, barrière cutanée et suivi régulier influencent la qualité du plan.

Attentes et plan d'entretien

Attente

- Repère de résultat: Le filler est une décision anatomique et de sécurité, pas seulement une question de volume.
- Documentation: produit, appareil, lot, profondeur, dose ou énergie doivent être traçables.
- Évaluation: les photos et l'évolution comptent plus que l'impression le jour de l'acte.
- Limite: plus de produit, d'énergie ou de séances ne signifie pas automatiquement plus de qualité.
- Repère de sécurité: Oedème et bleus peuvent survenir; douleur intense, pâleur, couleur en réseau ou troubles visuels sont urgents.

Langage du plan

- Séquence: l'option filler dermique doit être coordonnée avec les autres actes selon récupération et objectif.
- Éviter l'empilement: inflammation, risque pigmentaire ou oedème imposent un intervalle.
- Séparer les objectifs: la méthode choisie ne traite pas automatiquement volume, mouvement, qualité cutanée et laxité ensemble.
- Calendrier: avant voyage ou événement important, un plan conservateur est plus prudent.
- Alternative: si l'objectif ne correspond pas réalistement à filler dermique, une autre option ou l'absence d'acte doit être nommée.
- Contrôle: toute combinaison exige photos, signes d'alerte et contact clair.

Combinaisons et alternatives

Des étapes petites et ordonnées peuvent être plus contrôlées qu'un acte poussé trop loin.

1

- Séquence: l'option filler dermique doit être coordonnée avec les autres actes selon récupération et objectif.
- Éviter l'empilement: inflammation, risque pigmentaire ou oedème imposent un intervalle.

2

- Séparer les objectifs: la méthode choisie ne traite pas automatiquement volume, mouvement, qualité cutanée et laxité ensemble.
- Calendrier: avant voyage ou événement important, un plan conservateur est plus prudent.

3

- Alternative: si l'objectif ne correspond pas réalistement à filler dermique, une autre option ou l'absence d'acte doit être nommée.
- Contrôle: toute combinaison exige photos, signes d'alerte et contact clair.

Limite

Aucun acte ne convient à tout le monde. Ne pas traiter peut être la bonne décision médicale.

Validation médicale et notes

Zone de validation médicale

- Exactitude médicale et limites vérifiées.
- Avertissements de sécurité alignés avec le protocole.
- Noms de produit ou appareil à confirmer.
- Les consignes personnelles sont données lors de l'évaluation.

Questions à poser

- Pourquoi filler dermique convient-il à mon objectif?
- Quelle stratégie de produit, appareil, dose ou profondeur est prévue?
- Quels signes sont attendus et lesquels imposent un contact immédiat?
- Comment réduire le risque infectieux, vasculaire, pigmentaire ou énergétique?
- Quand comparerons-nous les photos et déciderons-nous la suite?

Statut de publication

Statut: brouillon prêt pour validation médicale. Avant publication, le Dr Murat Toktamışoğlu doit valider protocole, noms de produit/appareil et consignes personnelles.

Signature médecin

Date

Note de version

Mes notes

Checklist imprimable

Avant

- Pas d'infection, plaie ou coup de soleil.
- Médicaments et compléments listés.
- Allergies et actes antérieurs notés.
- Grossesse ou allaitement signalé.
- Nom du produit ou appareil à demander.
- Calendrier laissant du temps de récupération.
- Plan photo et contrôle à demander.
- Contact urgent enregistré.
- Consignes personnelles à écrire.
- Objectifs et limites clairs.

Pendant l'acte

- Zone nettoyée.
- Zones cibles confirmées.
- Matériel stérile à usage unique visible.
- Douleur, brûlure ou trouble visuel signalés.
- Détails produit ou appareil documentés.
- Des pauses de confort peuvent être demandées.
- Couleur, douleur et gonflement surveillés.
- Pas d'ajout d'acte précipité.
- Consignes à domicile revues.
- Date de contrôle à demander.

Après

- Ne pas frotter la zone.
- Reporter chaleur et sport intense.
- Timing maquillage et soins clair.
- Suivre gonflement et rougeur par photos.
- Ne pas gratter croûtes ou points.
- Un petit bleu peut être temporaire.
- Ne pas attendre si douleur augmente.
- Signaler rapidement un changement de couleur.
- Respiration, déglutition ou vision sont urgents.
- Garder le rendez-vous de contrôle.

Détail du suivi

Rendez-vous de contrôle, photos et signes d'appel précoce doivent être clairs avant le départ.

Suivi après acte

Date	Rougeur/oedème	Douleur/sensibilité	Note
Jour 0			
Jour 1			
Jour 2			
Jour 3			
Jour 4			
Jour 5			
Jour 6			
Jour 7			
Jour 8			

Contact précoce

- Douleur forte ou croissante
- Peau pâle, grise ou réticulée
- Modification visuelle
- Cloques ou peau ouverte

Questions à poser

Questions à poser

- Pourquoi filler dermique convient-il à mon objectif?
- Quelle stratégie de produit, appareil, dose ou profondeur est prévue?
- Quels signes sont attendus et lesquels imposent un contact immédiat?
- Comment réduire le risque infectieux, vasculaire, pigmentaire ou énergétique?
- Quand comparerons-nous les photos et déciderons-nous la suite?
- Quelle alternative serait plus honnête si mon objectif ne convient pas?

Court glossaire

- Acide hyaluronique: Composant résorbable fréquent des fillers.
- Complication vasculaire: Problème de circulation pouvant être urgent.
- Hyaluronidase: Enzyme pouvant dissoudre certains fillers HA.
- Contour: Travail de forme et proportion.

Note finale

Cette liste améliore l'échange; les décisions personnelles exigent examen et jugement médical.

Décision éclairée, plan mesuré.

Les sources ont servi à vérifier la sécurité, la discussion préalable et le langage de récupération.

1

U.S. Food and Drug Administration

Dermal Filler Do's and Don'ts for Wrinkles, Lips and More

Utilisée pour effets indésirables des fillers, risque vasculaire et signes de contact rapide.

<https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dermal-filler-dos-and-donts-wrinkles-lips-and-more>

Circuit de validation

Une validation médicale est requise avant usage clinique.

drmurattoktamisoglu.com